Автоматика и телемеханика, № 5, 2007, стр. 46–58

PACS 89.20.Ff

©2007 г. Ю.Г. ЕВТУШЕНКО, академик РАН,
В.У. МАЛКОВА,
А.А. СТАНЕВИЧЮС, канд. экон. наук
(Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН)

РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОИСКА ГЛОБАЛЬНОГО ЭКСТРЕМУМА[1]

Разработан параллельный алгоритм поиска глобального экстремума функции многих переменных. Алгоритм основан на методе неравномерных покрытий, предложенном Ю.Г. Евтушенко для функций, удовлетворяющих условию Липшица. Алгоритм реализован на языке C в MPI-системе параллельного программирования с передачей сообщений. Для ускорения расчетов используются вспомогательные процедуры поиска локального экстремума. Работа алгоритма демонстрируется на примере расчета строения атомного кластера.

1. Введение

В подавляющем большинстве оптимизационных задач требуется найти глобальный оптимум. Однако из-за большой сложности поиска глобального экстремума обычно ограничиваются отысканием локальных решений. Современные многопроцессорные ЭВМ существенно расширяют возможности решения задач глобальной оптимизации, позволяя использовать параллельные алгоритмы расчетов. Перенос последовательных алгоритмов и создание новых параллельных методов глобальной оптимизации становятся весьма актуальными. Обзор многочисленных публикаций по поиску глобального экстремума приведен в [1]. Проблемы распараллеливания вычислений подробно изложены в [2].

В 1971 г. в [3] был предложен и на языке АЛГОЛ-60 реализован метод неравномерных покрытий для нахождения глобального экстремума липшицевых функций. Дальнейшее развитие этот метод получил в [4, 5]. В данной работе рассматривается параллельный вариант метода неравномерных покрытий, дается информация о программной реализации его на языке C в MPI-системе параллельного программирования с передачей сообщений (Message Passing Interface). Для ускорения расчетов используются вспомогательные процедуры поиска локального экстремума. Работа алгоритма демонстрируется на примере расчета строения атомного кластера. Вычислительные эксперименты проведены на вычислительных комплексах MVS 6000 и MVS 15000 [6].

[1]Работа выполнена при финансовой поддержке программы N° 14 фундаментальных исследований Президиума РАН "Раздел II: Высокопроизводительные вычисления и многопроцессорные системы" 2006 г., а также программы N° 15 Президиума РАН "Исследование и создание научных приложений в распределенной среде суперкомпьютерных вычислений на базе ВЦ РАН" 2006 г.

2. Постановка задачи, общая идея метода покрытий

Рассмотрим задачу отыскания глобального минимума функции f, определенной и непрерывной на компактном множестве $P \subset \mathbb{R}^n$

$$f_* = \mathrm{glob} \min_{x \in P} f(x). \tag{1}$$

Через X_* обозначим множество решений задачи (1), через f_* — минимальное значение целевой функции $f(x)$. Введем множество ε-оптимальных (приближенных) решений задачи (1):

$$X_*^{\varepsilon} = \{x \in P : f(x) \leq f_* + \varepsilon\}. \tag{2}$$

Очевидно, $X_* \subset X_*^{\varepsilon} \subset P$. В большинстве практических задач достаточно найти хотя бы одну точку $x_r \in X_*^{\varepsilon}$ и взять в качестве оптимального значения f_* число $f_r = f(x_r)$. Другими словами, надо с заданной точностью ε определить величину глобального минимума функции и найти хотя бы одну точку x_r, где это приближенное значение достигается.

Введем набор множеств $B_m = [P_1, P_2, \ldots, P_m]$ из $\mathbb{R}^n$ и набор n-мерных точек $N_m = [c_1, c_2, \ldots, c_m]$ таких, что $c_i \in P_i \subset P$ для всех $1 \leq i \leq m$. Объединение m множеств P_i обозначим через

$$U_m = \bigcup_{i=1}^{m} P_i.$$

Будем говорить, что объединение множеств P_i покрывает множество P, если

$$P = U_m. \tag{3}$$

В каждой точке c_i вычисляется значение функции f, и по формуле

$$R_m = \min_{1 \leq i \leq m} f(c_i) = f(c_r) \tag{4}$$

определяется рекордная точка c_r и рекорд R_m.

Предположим, что функция f и множество P_i таковы, что для всех $x \in P_i$ выполнено условие

$$f(x) \geq R_m - \varepsilon. \tag{5}$$

Основой метода неравномерных покрытий является следующее легко проверяемое

Утверждение 1. *Пусть набор множеств B_m и функция f таковы, что $U_m = P$ и выполнено условие* (5) *для всех $1 \leq i \leq m$. Тогда рекордная точка $c_r \in X_*^{\varepsilon}$.*

Действительно, если набор множеств P_i полностью покрывает P, то каждая точка x_* из X_* будет принадлежать по крайней мере одному из множеств P_i. Пусть $x_* \in P_s$, $s \leq m$; тогда, учитывая (5), получим

$$f_* = f(x_*) \geq R_m - \varepsilon = f(c_r) - \varepsilon.$$

Согласно (2), рекордная точка c_r принадлежит множеству ε-решений задачи (1).

Данное утверждение выражает основную идею метода неравномерных покрытий: вместо поиска глобального минимума на P ищутся глобальные минимумы на подмножествах, объединение которых совпадает с P. Множества P_i могут быть самыми разнообразными. Например, на каждом P_i функция f может удовлетворять условию Липшица со своей константой L_i. В некоторых областях функция может оказаться выпуклой или дважды дифференцируемой. Все эти особенности целесообразно учитывать для ускорения расчетов.

При реализации метода наборы B_m и N_m строятся последовательно, после каждого вычисления значения функции f происходит уточнение рекорда. Считаем, что последнее вычисление f было выполнено в точке c_m, рекордная точка была c_r, а рекорд был R_m. Определим следующее лебегово множество:

$$\mathcal{L}_m = \{x \in P : R_m - \varepsilon \leq f(x)\}. \tag{6}$$

Пусть глобальный минимум на $\mathcal{L}_m$ достигается в точке x_ℓ. Тогда $R_m - f(x_\ell) = f(c_r) - f(x_\ell) \leq \varepsilon$ и, следовательно, в результате глобальной минимизации на $\mathcal{L}_m$ рекорд R_m может быть уточнен не более чем на ε. Поэтому множество $\mathcal{L}_m$ не представляет интереса и может быть исключено из области поиска P.

Если после описанных вычислений условие $P = U_m$ не выполнено, то поиск минимума продолжается на множестве $W_m = P \backslash U_m$. Пусть определены $c_{m+1} \in P_{m+1} \subseteq W_m$, вычислены $f(c_{m+1})$ и R_{m+1}. Если на P_{m+1} выполнено условие $f(x) \geq R_{m+1} - \varepsilon$, то множество P_{m+1} может быть исключено и поиск минимума продолжается на $W_m \backslash P_{m+1}$. В противном случае множество P_{m+1} разбивается на несколько подмножеств, в каждом из них вычисляются значения функции f, пересчитывается рекорд, некоторые подмножества исключаются, другие дробятся и т. д. Процесс заканчивается, когда все множество P будет полностью покрыто. Последовательность рекордов — монотонно убывающая. Последовательность лебеговых множеств $\mathcal{L}_m$, напротив, расширяющаяся, т. е. $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}_{m+k}$ при $k \geq 0$. Поэтому если при некотором $s \leq m$ из P было исключено множество P_s, то P_s может быть исключено из P и при всех $s \geq m$.

Лебегово множество $\mathcal{L}$ будет наибольшим, если в (6) взять $R_m = f_*$. Однако априори величина f_* не известна. Поэтому для уменьшения рекорда целесообразно использовать методы локального поиска минимума функции f на множестве P. В тех точках $c_i \in P$, где получено, что $f(c_i) < R_m$, происходит улучшение рекорда, и есть основание полагать, что решая задачу локального поиска

$$\operatorname{loc} \min_{x \in P} f(x),$$

стартуя из точки c_i, удастся найти другую точку $\bar{c} \in P$, в которой $f(\bar{c}) < f(c_i)$. Такой прием часто существенно ускоряет расчеты, позволяя улучшить рекорд и тем самым расширить область, которую можно отбрасывать в процессе покрытия множества P.

Наиболее трудным этапом в реализации алгоритма поиска экстремума является определение хотя бы некоторой части множества $\mathcal{L}_m$. Здесь приходится налагать на функцию f дополнительные требования. Предположим, что для $f(x)$ можно построить миноранту $g(c_i, x)$ такую, что для всех $x, c_i \in P$ выполнены неравенства

$$g(c_i, x) \leq f(x), \qquad g(c_i, c_i) = f(c_i). \tag{7}$$

Определим множество

$$N_i = \{x \in P : R_m - \varepsilon \leq g(c_i, x)\}. \tag{8}$$

Из (7) следует, что $N_i \subseteq \mathcal{L}_m$, поэтому множество N_i можно исключить из области поиска P. Приведем два простейших случая, когда миноранты, удовлетворяющие (7), легко строятся. Пусть функция f удовлетворяет условию Липшица с константой L, т. е. для любых x и c_i из P выполнено неравенство

$$|f(x) - f(c_i)| \leq L\|x - c_i\|_\infty. \tag{9}$$

Здесь и ниже используется p-я гельдеровская норма

$$\|v\|_p = \left(\sum_{j=1}^{n} |v^j|^p \right)^{1/p},$$

которая при $p = \infty$ совпадает с чебышевской нормой

$$\|v\|_\infty = \max_{1 \le j \le n} |v^j|.$$

Тогда для всех $x \in P$ имеем

$$f(x) \ge f(c_i) - L\|x - c_i\|_\infty.$$

Поэтому можно взять удовлетворяющую (7) миноранту

$$g(c_i, x) = f(c_i) - L\|x - c_i\|_\infty. \tag{10}$$

Введем множество

$$K_i = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - c_i\|_\infty \le \rho_{im}\}, \tag{11}$$

где

$$\rho_{im} = (f(c_i) - R_m + \varepsilon)/L. \tag{12}$$

Здесь K_i — куб с центром в точке c_i и главной диагональю $2\rho_{im}$ (или если $p = \infty$, то шар с центром в точке c_i и радиусом ρ_{im}).

Если $c_i \in P$ для всех $1 \le i \le m$, то согласно (5) $f(c_i) \ge f(c_r)$, поэтому радиус ρ_{im}, задаваемый формулой (12), будет больше или равен ε/L:

$$\min_{x \in K_i} g(c_i, x) = f(c_i) - L \max_{x \in K_i} \|x - c_i\|_\infty = f(c_i) - L\rho_{im} \ge R_m - \varepsilon.$$

Следовательно, куб K_i можно исключить из области поиска P. Если объединение кубов K_i, $1 \le i \le m$, удовлетворяющих (10), покрывает множество P, то $c_r \in X_*^\varepsilon$.

Радиус шара K_i будет большим, если $f(c_i) \gg f(c_r)$, и малым в областях, где $f(c_i) \approx \approx f(c_r)$. Благодаря этому возможно неравномерное покрытие множества P шарами различного радиуса.

Если, помимо (9), выполнено условие вида $\|f'(x) - f'(z)\|_1 \le M\|x - z\|_\infty$ и σ есть скалярное произведение векторов $f'(c_i)$ и $x - c_i$, то

$$f(x) - f(c_i) \ge \sigma - M\|x - c_i\|_\infty \ge -\|x - c_i\| \cdot \|f'(c_i)\|_1 - M\|x - c_i\|_\infty^2.$$

Объединяя это с (10), получим, что минорантой будет

$$g(c_i, x) = f(c_i) - \|x - c_i\| \cdot \min\{L, \|f'(c_i)\|_1 + M\|x - c_i\|_\infty\}.$$

Возможны другие способы определения нижней оценки функции f.

3. Алгоритм последовательного покрытия

При программной реализации метода вводятся дополнительные упрощающие предположения. Считается, что допустимое множество P — это n-мерный параллелепипед с гранями, параллельными координатным плоскостям:

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n, a \le x \le b\}.$$

Здесь и ниже неравенство $a \le x$ означает, что $a^j \le x^j$ для всех $1 \le j \le n$.

В процессе расчетов используются вспомогательные векторы $a_i, b_i \in \mathbb{R}^n$ и порождаемые ими прямоугольные параллелепипеды с гранями, параллельными координатным плоскостям: $P_i = \{x \in \mathbb{R}^n : a_i \le x \le b_i\}$.

Будем считать, что все векторы $a_i \ge a$ и $b_i \le b$. Таким образом, все параллелепипеды $P_i \subseteq P$. В качестве точек c_i берутся центры параллелепипедов P_i:

$$c_i^j = (a_i^j + b_i^j)/2, \qquad 1 \le j \le n.$$

Вектор главной диагонали d_i параллелепипеда P_i имеет компоненты $d_i^j = b_i^j - a_i^j$, $1 \le$ $\le j \le n$.

Считаем, что функция f удовлетворяет условию Липшица (9) всюду на P с одной и той же константой L. Воспользуемся минорантой (10). Обозначим

$$y_i = \min_{x \in P_i} g(c_i, x) = f(c_i) - \frac{L}{2} \max_{1 \le j \le n} \|d_i^j\| = f(c_i) - \frac{L}{2}\|d_i\|_\infty. \tag{13}$$

Если $y_i \ge R_m - \varepsilon$, то параллелепипед P_i может быть исключен, так как глобальный минимум на нем не дает улучшения текущего рекорда R_m более чем на ε, и поиск продолжается на множестве $P \backslash P_i$. В противном случае если $y_i < R_m - \varepsilon$, то параллелепипед P_i делится пополам по максимальному ребру и поиск ведется на этих двух частях. Если главные диагонали одной или обеих частей меньше, чем $2\varepsilon/L$, то эти части исключаются из области поиска. В центрах оставшихся частей вычисляются значения $f(x)$. При этом, если возможно, улучшается рекорд и проверяется условие покрытия обеих частей. Части, которые оказались покрытыми, исключаются из области поиска. Если обе части исключены, то P_i исключен, если нет, то продолжается дальнейшее деление до тех пор, пока параллелепипед P_i не будет покрыт. Возможны самые разнообразные способы покрытия параллелепипеда P. В [3], например, с помощью рекурсивных процедур на языке АЛГОЛ-60 реализовано послойное покрытие. Этот вариант использовался для решения задач глобальной оптимизации в случае, когда $n \le 15$. Ниже, следуя [4], для покрытия P применим метод ветвей и границ. Аналогичный подход для задач ранцевого типа использовался в [7].

С каждым параллелепипедом P_i свяжем набор $S_i = (c_i, d_i, y_i)$. Совокупность наборов S_i для всего набора непокрытых параллелепипедов B_m будем называть списком наборов и обозначать $S = \{S_1, S_2, \dots, S_m\}$. Запись $S = \emptyset$ означает, что список S пуст.

В следующей формулировке алгоритма буква k будет обозначать порядковый номер итерации основного цикла.

Начальные операции. Положить $k = 1$, $m = 1$, $P_1 = P$. Задать $\varepsilon > 0$, L и некоторую точку $x_0 \in P$. Вычислить c_1, d_1, $f(c_1)$, $f(x_0)$, y_1, $z = \varepsilon/L$, $\tilde{R} = \min\{f(c_1), f(x_0)\}$. Положить $N_1^{(1)} = \{c_1\}$, $B_1^{(1)} = \{P_1\}$, $S_1 = (c_1, d_1, y_1)$, $S^{(1)} = \{S_1\}$. Если $\tilde{R} = f(c_1)$, то в качестве рекордной точки взять c_1, иначе — точку x_0. Если $y_1 \ge \tilde{R} - \varepsilon$, то закончить работу.

Основной цикл. Повторять следующие шаги 1–5, пока $S^{(k)} \ne \emptyset$, т. е. до тех пор, пока множество P не будет полностью покрыто.

1. Из текущего набора параллелепипедов $B_m^{(k)}$ выбрать тот параллелепипед P_s, для которого

$$y_s = \min_{1 \le i \le m} y_i.$$

2. В параллелепипеде P_s определить t — номер наибольшего ребра:

$$d_s^t = \max_{1 \le j \le n} d_s^j.$$

3. Разделить параллелепипед P_s пополам по t-й координате, породив тем самым два новых параллелепипеда P' и P''. Их центры и главные диагонали обозначим c', d' и c'', d'' соответственно. Исключить параллелепипед P_s из набора $B_m^{(k)}$, удалить набор S_s из списка $S^{(k)}$ и положить $m = m - 1$.

4. Вычислить

$$\tilde{R} = \min\{f(c'), f(c'')\} \tag{14}$$

и, используя (12), определить $y' = f(c') - Ld'/2$, $y'' = f(c'') - Ld''/2$.

Если $\tilde{R} \geq R^{(k)}$, то положить $R^{(k+1)} = R^{(k)}$. Если $y' < R^{(k+1)} - \varepsilon$ и $d' \geq 2z$, то включить $S' = (c', d', y')$ в список наборов и положить $m = m + 1$; если $y'' < R^{(k+1)} - \varepsilon$ и $d'' \geq z$, то включить $S'' = (c'', d'', y'')$ в список наборов и положить $m = m + 1$.

Если $\tilde{R} < R^{(k)}$, то положить $R^{(k+1)} = \tilde{R}$. В качестве рекордной точки x_r взять ту из точек c', c'', в которой достигается минимум (14). Каждый набор S_i из $\{S_i\}_{1 \leq i \leq m}$, удовлетворяющий условию $y_i \geq R^{(k+1)} - \varepsilon$, исключить из этого списка. Новый список наборов $\{S_{i1}, S_{i2}, \ldots, S_{im}\}$ перенумеровать и обозначить $S^{(k+1)} = \{S_j\}_{1 \leq j \leq m}$.

5. Положить $k = k + 1$.

Заметим, что главная диагональ параллелепипеда, полученного описанным дроблением, не меньше, чем $2\varepsilon/L$. С учетом этого факта несложно доказать, что имеет место

Утверждение 2. *Пусть в задаче* (1) *функция* f *удовлетворяет условию Липшица с константой* L *на* n*-мерном прямоугольном параллелепипеде* P. *Тогда описанный алгоритм за конечное число вычислений значений функции* f *определяет рекордную точку* $x_r \in X_*^{\varepsilon}$.

После завершения расчетов множество P будет полностью покрыто параллелепипедами P_i, а рекордная точка x_r будет ε-решением задачи (1). Можно использовать другие, отличающиеся от указанного на шаге 1, правила выбора параллелепипеда из текущего набора. Укажем следующие два правила:

- выбрать тот параллелепипед P_s, который был включен первым в текущий набор параллелепипедов;
- выбрать тот параллелепипед P_s, который был включен последним в текущий набор параллелепипедов.

Работу описанного алгоритма существенно ускоряют процедуры локального поиска экстремума. В приведенных ниже результатах расчетов для локального поиска использовался метод сопряженных градиентов с операцией проектирования на параллелепипед P. Программная реализация была осуществлена Н.И. Грачевым.

Приведенный алгоритм можно интерпретировать как метод ветвей и границ [7]:

- на шаге 1 осуществляется выбор множества для ветвления;
- на шаге 2 реализуется правило, определяющее способ ветвления;
- на шаге 3 выполняется ветвление;
- на шаге 4 по формуле (13) вычисляются оценки y', y'', отвечающие новым множествам-кандидатам для ветвления, выполняется пересчет рекорда R и производится (если рекорд улучшен) отсев множеств, которые могут быть исключены из области поиска.